

Чем подкармливать чеснок, для крупной головки?



Народные средства

Популярными являются смеси перегноя, древесной золы и воды. На 1 литр перегноя (коровьего) либо птичьего помета берется литр золы, перемешивается, смесь заливается 10 литрами теплой воды. Смесь остужается до температуры окружающей среды.

Хорошим выбором, особенно в начале сезона, являются нашатырный спирт и мочевина. На 10 литров воды берется 1 чайная ложка мочевины и тщательно перемешивается.

Смесью проливают грядки с зелеными всходами.

Нашатырь используют для внекорневой подкормки. На терке натирается 72% хозяйственное мыло в количестве 100 грамм, растворяется в 10 литрах теплой воды. После полного растворения мыла добавляется 50 грамм 25% нашатырного спирта. Смесью опрыскивают зеленые части чеснока. Для хранения данная смесь непригодна, ее расходуют полностью. Такая подкормка вносится при азотистом голодании растений в июне-июле, а также после удаления стрелок.

Для роста головок делают раствор из древесной золы – 2 кг золы на 10 литров теплой воды. Раствор остужают и проливают им грядки как можно ближе к корням растения.

Магазинные препараты

Существуют как специальные препараты для лука и чеснока, да и отдельно продаваемые фосфаты, суперфосфаты, калийные фосфаты. Их лучше всего использовать в июне-июле после удаления стрелок. На 10 литров воды берется 1 столовая ложка сухого минерального вещества, разбалтывается до полного растворения и проливается из расчета 10 литров на квадратный метр.

Весной для подкормки используется нитроаммоска либо нитроаммофоска. На 10 литров воды берется 2 столовые ложки сухого минерального вещества до полного растворения, полученным раствором поливают площадь в 1 квадратный метр грядки.

Особые цели подкормок

Плохо растет

Если зелень чеснока желтеет, плохо растет, это говорит о явном недостатке минеральных и органических веществ в почве. Такое может происходить даже при своевременной подкормке при истощении почвы. Чаще всего не хватает калия и азота. Для «внеочередных подкормок» применяется мочевина, фосфаты калия, нитрофоска, сульфаты аммония, а также древесная зола. Они вносятся либо в почву прикорневой подкормкой, либо внекорневой, опрыскивая ботву.

Нужно увеличить размер головок

Хорошим удобрением для увеличения размера луковиц будет разведенная навозная жижа в соотношении 1:6 из расчета 10 литров на квадратный метр грядки. Также неплохим подспорьем для больших головок будет внесение азота в грядку до посадки ярового чеснока и весной после схода снега для озимого.

Перед уборкой

Нет смысла удобрять чеснок перед его уборкой – все питательные вещества, которые растения могло усвоить, уже усвоены, и чрезмерное удобрение может снизить качество луковиц.

После удаления стрелок

Для правильного роста луковиц нужно своевременно удалять стрелки. После их удаления чеснок нужно удобрить фосфатно-калиевыми удобрениями

Автор рубрики: М.А. Петрова, заведующая Селищенской сельской библиотекой